



**АТЛАНТИС®**  
ФЛЕКС

# НЕПОКЛАТИМ КАТО СКАЛА

**СРЕЩУ ТЕЖКО И КОМПЛЕКСНО  
ЖИТНО ЗАПЛЕВЕЛЯВАНЕ**



**Bayer**

[www.cropscience.bayer.bg](http://www.cropscience.bayer.bg)

*Използвайте продуктите за растителна защита съгласно инструкциите, посочени в етикета.*



**АТЛАНТИС®**  
ФЛЕКС

//// **АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:**  
Мезосулфурон-метил 45 г/кг,  
Пропоксикарбазон-натрий 67,5 г/кг,  
Мефенпир-диетил (антидот) 90 г/кг

//// **ФОРМУЛАЦИЯ:**  
Вододиспергируеми гранули (ВГ)


//// **КАРАНТИНЕН СРОК:**  
не се изисква

//// **КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА:**  
II-ра професионална

//// **РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА:**  
Атлантис Флекс 20,25 ВГ

////////// **ПЕРИОД НА ПРИЛОЖЕНИЕ**

// От фаза 3-ти лист до втори стъблен възел на културното растение.



**Възможен период на приложение**

- // По-лесно се контролират плевели в начални фази от развитие 2-6 лист.
- // Навременното третиране намалява конкуренцията от плевелната растителност и съхранява на максимум добивния потенциал на културата.

////////// **ДОЗИ И МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ**

<b>КУЛТУРА</b>	<b>ДОЗА гр/дка</b>	<b>МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ</b>	<b>ПРИЛЕПИТЕЛ мл/дка</b>
Зимна пшеница	20 – 33 г/дка	От фаза три разтворени листа	100 мл/дка
Твърда пшеница	20 – 33 г/дка	до фаза удължаване на стъблото – вторият възел е	100 мл/дка
Тритикале	20 – 33 г/дка	най-малко на 2 см над първия	100 мл/дка

**АТЛАНТИС**<sup>®</sup>  
ФЛЕКС

+

**biopower**<sup>®</sup>

# //////// НАДЕЖДНО ДЕЙСТВИЕ НА ХЕРБИЦИДА ВЪРХУ ПЛЕВЕЛИТЕ

## ЕФЕКТИВНОСТ ВЪРХУ ВЛАСАТКА



Атлантис Флекс

контрола

## ЕФЕКТИВНОСТ ВЪРХУ РАЙГРАС



Атлантис Флекс

контрола

Третираният райграс 35 дни по-късно трудно се намира в полето. Растенията са силно подтиснати и започват да изсъхват. Докато в контролата се наблюдава начало на братене на райграса със силно развит корен.

Унищожен напълно райграс, 25 дни след третиране

## ЕФЕКТИВНОСТ ВЪРХУ ОВСИГА АТЛАНТИС ФЛЕКС 30 ГР/ДКА + БИОПАУЪР



Напълно унищожена коренова система.  
Некротирала надземна маса.

## ЕФЕКТИВНОСТ СРЕЩУ ДИВ ОВЕС АТЛАНТИС ФЛЕКС 30 ГР/ДКА + БИОПАУЪР



Контрола



**АТЛАНТИС®**  
ФЛЕКС

////////// **ДЕЙСТВИЕ НА АТЛАНТИС ФЛЕКС  
ВЪРХУ ЖИТНИ И ШИРОКОЛИСТНИ  
ПЛЕВЕЛИ**

**СТЕПЕН НА ЕФИКАСНОСТ НА  
АТЛАНТИС ФЛЕКС**

при доза на прилагане – 33 г/дка +  
Биопауър 100 мл/дка (прилепител)

////////// **СИЛНО ЧУВСТВИТЕЛНИ ≥ 95%:**

Житни - Полска лисича опашка (*Alopecurus myosuroides*), Обикновена ветрушка (*Apera spica-venti*), Див овес (*Avena fatua*), Южен овес (*Avena sterilis*), Полска овсига (*Bromus arvensis*), Многогодишен райграс (*Lolium perenne*), Обикновена метлица (*Poa trivialis*), Едногодишна метлица (*Poa annua*). Широколистни - Дива ряпа (*Raphanus raphanistrum*), Полски синап (*Sinapis arvensis*).

////////// **ЧУВСТВИТЕЛНИ 85 % ДО 94 %:**

Житни - Дългоосилеста овсига (*Bromus sterilis*), Италиански райграс (*Lolium multiflorum*), Твърда глушица (*Lolium rigidum*). Широколистни - Полско подрумче (*Anthemis arvensis*), Лъчисто колендро (*Bifora radians*), Лайка (*Matricaria chamomilla*), Врабчови чревца (*Stellaria media*)



**АТЛАНТИС<sup>®</sup>**  
ФЛЕКС

**НЕПОКЛАТИМ  
КАТО СКАЛА**

////// **ПРЕДИМСТВА**

- // **Спектър на действие:** срещу едно-годишни житни и някои широколистни плевели
- // **АТЛАНТИС ФЛЕКС** гарантира надежден контрол на изключително трудните за борба райграс, власатка и овсига
- // Безопасен към културното растение благодарение на антидотната технология



**Bayer**

[www.cropscience.bayer.bg](http://www.cropscience.bayer.bg)