



**ПРОПУЛС™**

# ЗАЩИТЕТЕ БЪДЕЩЕТО НА ВАШАТА РЕКОЛТА



**Bayer**

[www.cropscience.bayer.bg](http://www.cropscience.bayer.bg)

*Използвайте продуктите за растителна защита съгласно инструкциите, посочени в етикета.*



# ПРОПУЛС™

**АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:**

Флуопирам – 125 г/л;  
Протиоконазол - 125 г/л

**ФОРМУЛАЦИЯ:**

Суспо-емулсия (СЕ)

**КАРАНТИНЕН СРОК:**

56 дни

**КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА:**

II-ра професионална



## Механизъм на действие

**Пропулс® 250 СЕ** е фунгицид със системно действие. Флуопирам принадлежи към групата на SDHI фунгициди, протиоконазол е триазол от последно 3-то поколение.



## Предимства и ползи

- // Най-подвижният SDHI.
- // Комплексна защита от всички болести.
- // Изключителен контрол на склеротиния при рапица и слънчоглед.
- // Положителен ефект върху заздравяването на шушулките при рапица
- // Положителен ефект върху масленото съдържание





## Регистрирани употреби

КУЛТУРА	ЗА БОРБА СРЕЩУ	ДОЗА	КОЛИЧЕСТВО РАБОТЕН РАЗТВОР НА ДЕКАР	МОМЕНТ НА ПРИЛАГАНЕ	МАКСИМАЛЕН БРОЙ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ВЕГЕТАЦИЯ	ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ТРЕТИРАНИЯТА
Рапица	Фомоза ( <i>Phoma lingam</i> ), Склеротиния ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ), Бели листни петна ( <i>Pseudocercospora capsellae</i> ), Алтернария ( <i>Alternaria brassicae</i> ), Брашнеста мана ( <i>Erysiphe cruciferarum</i> ), Цилиндроспориоза ( <i>Cylindrosporium spp.</i> )	100 мл/дка	10-30 л/дка	От фаза разтворен четвърти лист до фаза 30% от шушулките са оформени ВВСН 14-73  При спазване на закона за пчеларството	1	-
Слънчоглед	Черни петна (фомоза) ( <i>Phoma macdonaldii</i> ), Сиви петна (фомопсис) ( <i>Phomopsis helianthii</i> ), Склеротийно увяхване (склеротиния) ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ), Алтернария ( <i>Alternaria helianthii</i> ), Сиво гниене ( <i>Botrytis cinerea</i> )	80-100 мл/дка	15-40 л/дка	От фаза шести лист до фаза езичестите цветове се виждат между прилистниците, кошничката е затворена ВВСН 16-59  При спазване на закона за пчеларството	2	14 дни
Царевица	Дребни листни петна ( <i>Kabatiella zaeae</i> ), Северен листен пригор ( <i>Helminthosporium turcicum</i> / <i>Exserohilum turcicum</i> ), Южна петнистост ( <i>Helminthosporium carbonum</i> )	80-100 мл/дка	20-40 л/дка	От фаза начало на удължаване на стъблото до фаза край на цъфтежа: косата е напълно суха ВВСН 30-69  При спазване на закона за пчеларството	2	14 дни
Сладка царевица	Северен листен пригор ( <i>Helminthosporium turcicum</i> / <i>Exserohilum turcicum</i> )	100 мл/дка	10-40 л/дка	От фаза начало на удължаване на стъблото до фаза край на цъфтежа: косата е напълно суха ВВСН 30-69  При спазване на закона за пчеларството	2	14 дни

## ЕФИКАСНОСТ НА ПРОПУЛС® СРЕЩУ БОЛЕСТИ ПО РАПИЦА

Доза на дка	Фома	Бели листни петна	Склеротиния	Брашнеста мана	Алтернария	Цилиндроспориоза
100 мл	++++	+++	++++	++++	++++	+++

## ЕФИКАСНОСТ НА ПРОПУЛС® СРЕЩУ БОЛЕСТИ ПО СЛЪНЧОГЛЕД

Доза на дка	Черни петна (фомоза)	Сиви петна (фомопсис)	Склеротийно увяхване (склеротиния)	Алтернария	Сиво гниене
80-100 мл	++++	++++	++++	++++	++++




### Ефикасност на Пропулс® срещу склеротиния и фома в рапица

Склеротиния

Пропулс®

Фома



### Комплексна защита с Пропулс® в слънчоглед

Контрола

Пропулс®

